



# PROFILAKTYKA JODOWA

## LISTA PUNKTÓW WYDAWANIA JODKU POTASU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie: Żelechów, ul. Chełmońskiego 21;
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach: Bartoszkówka, ul. Strażacka 9;
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej, siedziba: Słubica Dobra, ul. Słoneczna 36;
4. Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie: Ojrzanów, ul. Szkolna 1;
5. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie: Józefina, ul. Mazowiecka 1;
6. Gminne Przedszkole Publiczne w Żabiej Woli „Leśna Kraina”: Żabia Wola, ul. Leśna 2;
7. Publiczne Przedszkole „Żabka”: Żabia Wola, ul. Warszawska 9;
8. Publiczne Przedszkole „Promyk”: Ojrzanów -Towarzystwo, ul. Długa 12;
9. Żłobek Gminny w Żabiej Woli: Żabia Wola, ul. Spółdzielcza 1;
10. Apteka Żabia Wola: Żabia Wola, ul. Warszawska 15;
11. NZOZ "Medycyna Rodzinna" Filia w Żabiej Woli: Żabia Wola, ul. Warszawska 24;
12. Med - House Stomatologia & Medycyna: Żelechów, ul. Chełmońskiego 82a;
13. Wodna Osada Piotr Dec: Grzegorzewice, ul. Pałacowa 58.

### KIEDY NIE PRZYJMOWAĆ LEKU?

- jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli masz nadczynność tarczycy;
- jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią);
- jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa).

### SPYTAJ LEKARZA:

#### PRZED PRZYJĘCIEM LEKU

- w przypadku podejrzenia/ występowania złośliwego nowotworu tarczycy;
- w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu);

#### PO PRZYJĘCIU LEKU

- w przypadku noworodka w celu skontrolowania czynności tarczycy;

#### JEŚLI

- leczysz lub leczyłeś/-łaś choroby tarczycy;
- cierpisz na nieleczoną autonomię tarczycy;
- masz zaburzenie czynności nerek;
- masz zaburzenie czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane;
- jesteś odwodniony/-na;
- przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub hinidynę.